

复方短效口服避孕药应用中不定期出血的管理

马 淼^{1,2}, 唐瑞怡¹, 陈 蓉¹

¹ 中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院妇科内分泌与辅助生殖中心, 北京 100730

² 复旦大学附属妇产科医院妇产科, 上海 200011

通信作者: 陈 蓉 电话: 010-69155012, E-mail: chenrongpumch@163.com

【摘要】 不定期出血是复方短效口服避孕药应用期间女性停药的常见原因。不定期出血的充分告知以及必要的预防和治疗, 能够提高女性口服避孕药的依从性。但目前关于不定期出血的机制尚不明确, 且缺乏高级别证据支持的有效预防和治疗方法。对于新发或持续性不定期出血妇女, 排除妇科疾病很重要。

【关键词】 复方短效口服避孕药; 不定期出血; 管理

【中图分类号】 R715.2 **【文献标志码】** A **【文章编号】** 1674-9081(2020)01-0073-06

DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.20170182

Management of Unscheduled Bleeding in Women Using Combined Oral Contraceptives

MA Miao^{1,2}, TANG Rui-yi¹, CHEN Rong¹

¹Gynecological Endocrinology and Reproductive Center, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing 100730, China

²Department of Obstetrics & Gynecology, Obstetrics & Gynecology Hospital of Fudan University, Shanghai 200011, China

Corresponding author: CHEN Rong Tel: 86-10-69155012, E-mail: chenrongpumch@163.com

【Abstract】 Unscheduled bleeding is a common cause of discontinuation during the using of combined oral contraceptives (COC). Compliance can be improved by appropriate counseling about the possibility of unscheduled bleeding, as well as by the necessary prevention and treatment. The mechanisms underlying this kind of bleeding are not fully understood. There is little high-level evidence of clinical strategies to support the management of unscheduled bleeding associated with COC. It is critical to rule out gynecological pathology for patients with persistent or new-onset unscheduled bleeding.

【Key words】 combined oral contraceptive; unscheduled bleeding; management

Med J PUMCH, 2020,11(1):73-78

复方短效口服避孕药 (combined oral contraceptive, COC) 具有高效、简便、可逆等优点, 临床上被广泛用于避孕。女性停用 COC 的一个常见原因是对于子宫出血量、持续时间、出现时机不满意。最令女性困扰的子宫出血是不定期出血。对于口服 COC 的妇

女, 预防或治疗不定期出血可增加避孕措施的可接受性和依从性, 从而获得更好的避孕效果。关于口服 COC 期间不定期出血的可能原因、临床管理和处理方法尚无共识, 因此, 本文将就这些问题分别展开论述。

1 复方短效口服避孕药简介

COC 是含有高效孕激素和低剂量雌激素的复方制剂^[1]。正确使用 COC，避孕的有效率可达 99% 以上^[1]。除此以外，COC 还能提供诸多非避孕获益，例如治疗异常子宫出血、经前期综合征、女性痤疮、多毛、痛经、子宫内膜异位症等^[2-3]。

从第 1 个 COC “Enovid” 上市至今，COC 已有超过 50 年的发展历史。且其安全性、有效性及可接受性不断改善^[1,4]，主要表现在以下 3 个方面，同时也可根据以下 3 个方面将 COC 划分为不同种类：(1) 降低雌激素的剂量：由 150 μg 减少到 30~35 μg ，甚至 20 μg ；(2) 开发和应用新型孕激素：目前有第 1 代（醋酸炔诺酮、双醋酸炔诺醇等）、第 2 代（诺酮、左炔孕酮）、第 3 代（去氧孕烯、孕二烯酮等）及未分类孕激素（屈螺酮、醋酸环丙孕酮）；(3) 改进 COC 给药方案：目前有单相片、双相片（孕激素为 2 种剂量，雌激素为 1 种剂量）和三相片（雌孕激素 3 个剂量），以适应月经周期中激素水平的波动变化。

目前被广泛应用的是标准的 28 d 周期方案避孕药，除此之外，美国食品药品监督管理局还通过了 91 d 延长使用方案的避孕药和 365 d 持续使用方案的避孕药。不管是传统周期用药，还是延长或持续性用药，研究证明均安全、有效^[5]。

2 不定期出血的定义、原因及发生机制

预期出血或撤退性出血是指在口服 COC 时，不管用药方案如何，在未使用避孕药期间发生的任何出血。预期出血有可能持续至下一个用药周期的第 1~4 d^[6]。不定期出血，也有西方学者称其为“突破性出血（breakthrough bleeding）”，经常发生在口服 COC 前 3 个月。目前国内外均缺乏不定期出血的统一定义。2005 年在美国费城举办的“激素避孕试验方法共识会议”推荐的定义为：不管用药方案及持续时间，正在口服避孕药时的任何出血，需除外以下两种情况：(1) 第一个用药周期第 1~7 d 出血；(2) 从停药间期开始并持续至下一个用药周期的第 1~4 d 出血^[6]。

有统计数据显示，COC 用药期间不定期出血最常见的原因因为药物漏服^[7]，除此之外，可能为生殖道来源的器质性疾病、性传播疾病及意外怀孕。

关于不定期出血的确切机制暂不明确。在规范用

药前提下，并排除妊娠、其他器质性病变等因素导致不定期出血的基础上，目前研究认为可能的原因有：(1) 基质金属蛋白酶（matrix metalloproteinases, MMPs）表达上调。MMPs 是一组锌依赖的蛋白酶，主要集中在基质细胞和邻近的细胞外基质，降解细胞外基质糖蛋白酶类，在正常月经期降解内膜组织，使月经来潮。有研究表明，在发生不定期出血的女性子宫内膜组织中，MMPs 表达会出现上调^[8-9]。(2) 内膜浅表血管的脆性变化、内膜局部变化、结构整体性及组织灌注等的改变^[10]。(3) 体内雌激素浓度较高及卵泡较大。一项研究结果表明，与无不定期出血者相比，不定期出血的女性体内雌激素浓度较高、卵泡结构相对较大^[11]。(4) 此外，吸烟、服用利福平等药物的妇女发生不定期出血可能性增加^[12-13]。

3 不定期出血的类型

关于口服 COC 期间不定期出血的分类，不同研究所采用的分类方法不同，目前尚无统一的分类标准。2009 年在英国皇家妇产科学会与性和生殖健康学院（faculty of sexual and reproductive healthcare, FSRH）合作的“激素避孕妇女不定期出血的管理”指导意见中对不定期出血进行了分类，主要分为以下 4 种^[14]（每 90 天为一个参照周期）：(1) 频繁出血：出血次数 > 5 次；(2) 持续出血：一次或多次出血时间 ≥ 14 d；(3) 不规律出血：出血次数 3~5 次， ≥ 14 d 的无出血间期 < 3 次；(4) 点滴出血：出血量少，可能不需要使用卫生用品。

4 不定期出血妇女的处理

关于不定期出血妇女的诊治流程及方法，国内外仍缺乏相关指南。国外也仅限于不定期出血诊治的指导意见，例如英国皇家妇产科学会与 FSRH 合作提出的“激素避孕妇女不定期出血的管理”指导意见^[14]。几乎所有指导意见都建议对于 COC 临床应用中发生不定期出血的女性采用个体化管理原则，在对其进行一系列临床评估的基础上，决定下一步检查方法、诊断及治疗措施。在临床处理过程中，排除妇科疾病造成的出血非常重要。

4.1 临床评估

4.1.1 临床病史采集

临床病史主要包括以下内容：(1) 在服用 COC

之前是何种出血模式? 有无不规律阴道出血或经间期出血? (2) 是否正确服用药物, 有无漏服? COC 服用周期是按照药物本身推荐的 28 d (21 d 服用+7 d 休息) 模式还是延长服用天数? (3) 是否同时服用可能产生相互作用的药物, 从而影响了出血模式? (4) 了解有无影响 COC 吸收的其他疾病病史; (5) 了解不定期出血的天数、出血量及出血次数, 发生于 COC 服用周期的具体哪个阶段, 是一个周期的刚刚开始、中间或是一个周期即将服用完毕时? (6) 采集其他相关症状 (例如是否伴发疼痛、性交痛、阴道异常分泌物、出血量多、接触性出血); (7) 了解不定期出血女性所担心的问题及担心程度。

4.1.2 排除性传播感染

如年龄<25 岁, 近期更换新的性伴侣及阴道分泌物发生异常改变, 应警惕性传播感染性疾病, 尤其是衣原体感染^[7]。沙眼衣原体不论是在美国还是我国, 都是最常见的细菌性性传播疾病, 且大部分衣原体感染女性为无症状性, 可以表现为不规则阴道出血^[15-16]。故对于性传播感染风险高的女性, 应行阴道分泌物检查排除沙眼衣原体感染。

4.1.3 核实宫颈病变筛查结果

核实不定期出血妇女有无近期宫颈癌前病变筛查结果。若既往规律进行宫颈筛查且有近期宫颈筛查结果, 则暂不行宫颈筛查^[7]。但若行妇科检查时, 宫颈外观不佳或有接触性出血时, 即使之前有宫颈筛查结果, 仍可再次行宫颈筛查。

4.1.4 妊娠试验的必要性

询问末次月经时间, 了解是否不正确服用药物、是否同时服用影响药物吸收的相关药物, 有无影响 COC 吸收的相关疾病, 必要时行妊娠试验, 评估意外妊娠的可能^[7]。目前尚无证据表明在坚持正确服用 COC 基础上, 出现不定期出血的女性, 其意外妊娠率会增加。

4.2 症状出现的时间

在开始使用 COC 前 3 个月, 多达 30% 的女性会发生不定期出血, 第 3 个月时, 该比例下降至 10% 左右^[17]。

4.2.1 开始用药 3 个月内出现的不定期出血

COC 使用 3 个月内出现的不定期出血较常见。FSRH 指导意见中提出, 在开始用药 3 个月内出现的不定期出血, 可暂且观察随访, 并不需要进行过多的辅助检查和干预措施, 一般均可自行缓解改善, 且不建议立即更改 COC 种类^[14]。

4.2.2 开始用药超过 3 个月出现的不定期出血

若 COC 使用超过 3 个月出现出血且不规律、出血模式发生改变、之前未进行过宫颈筛查, 或伴有腹痛、性交痛等其他症状, 应警惕恶性肿瘤的可能, 例如宫颈癌、子宫内膜癌等, 可能需行进一步检查。在排除妇科器质性疾病导致的持续性出血后, 有学者提出建议更改用药方案或换用新的 COC^[18]。

4.3 进一步检查方法

在上述评估基础上, 根据个体化原则, 为不定期出血的妇女提供进一步检查: (1) 若既往无规律的宫颈筛查报告, 且妇科检查时宫颈外观质脆、有接触性出血, 可行宫颈筛查; (2) 若妇女感染风险较高, 且有异常的阴道分泌物, 可行阴道分泌物检查; (3) 若出血时间长、出血量多, 可行全血细胞分析有无贫血, 在此基础上若妇科检查触及子宫附件区包块, 可行妇科超声检查、盆腔磁共振等影像学检查; (4) 此外, 原因不明的长时间或出血模式发生改变的不定期出血, 特别是年龄 ≥ 45 岁 (或合并内膜癌高危因素且年龄<45 岁) 的女性, 建议进一步行宫腔镜检查及内膜活检, 排除宫腔占位病变, 如子宫内膜息肉以及内膜不典型增生甚或子宫内膜癌等^[7]。

5 不定期出血的预防与干预措施

口服 COC 期间不定期出血的预防和治疗并不容易。不定期出血预防的最重要措施是提高患者的用药依从性, 避免漏服。若为避孕目的口服 COC 但发生了漏服, 不同时间漏服有相应的应对措施^[19]。另外, 开始应用 COC 的时机选择也很重要, 为达到可靠避孕效果, 建议从月经的第 1~5 天开始应用。

不定期出血治疗方法非常有限且缺乏高质量证据支持, 主要为指导意见, 且其中一些方法仍存在不同程度的争议。适当增加雌激素可实现更好的周期控制, 减少不定期出血。短暂停药对于延长或持续口服 COC 出现不定期出血的妇女有一定疗效。口服低剂量多西环素、更改孕激素种类和剂量是否能改善不定期出血, 存在不同程度的争议。更改 COC 相型及用药方案不能改善不定期出血^[4,7,14,19]。

5.1 不同时间漏服 COC 的应对

参照“2013 年美国避孕方法的选择实践推荐”中关于 COC 漏服的应对^[19]。

5.1.1 漏服 1 片 (漏服时间<48 h)

应尽快服用 1 片 COC 并坚持按时服用剩下的药

片(尽管有时可能同一天服用2片COC),不需要其他避孕保护措施。紧急避孕药并非必需,但当漏服的药物发生在服药早期或最后一周,可以服用紧急避孕药。

5.1.2 漏服 ≥ 2 片(漏服时间 ≥ 48 h)

立即补服1片,若剩余药片为7片及以上时,可继续常规服药,同时需要避孕套等屏障避孕至少7d,或采用紧急避孕;若剩余药物不足7d,可在常规服用完本周期药片后立即服用下一周期的药片。

5.2 适当增加雌激素含量

FSRH“激素避孕妇女不定期出血的管理”^[14]及“2013年美国避孕方法的选择实践推荐”^[19]中均提出适当增加雌激素剂量(如雌激素含量每天增加到35 μg)可减少不定期出血天数并降低不定期出血发生率。大多数研究结果均支持这一结论,但仍有小部分研究结果表示不支持。Kaunitz等^[20]进行的多中心研究比较了含20、25、30 μg 炔雌醇COC的不定期出血发生率,发现雌激素含量越高,不定期出血的发生率越低。一项系统综述中,雌激素含量大于20 μg 的避孕药相比于含20 μg 雌激素的避孕药,不定期出血的发生率较低^[21]。但Edelman等^[22]对持续使用COC妇女进行的随机对照试验(randomized controlled trial, RCT)结果表明,雌激素含量30 μg 组与20 μg 组相比,不定期出血发生率并无明显差异。

5.3 短暂停药

延长或持续性应用COC(指持续口服超过21d或24d)的妇女出现不定期出血时,短暂停药3~4d可有效减少不定期出血的天数。Sulak等^[23]将延长应用COC期间发生不定期出血的女性分成两组,比较继续用药组和短暂停药3d组不定期出血改善情况,发现短暂停药组不定期出血的天数明显减少。

5.4 口服低剂量多西环素

多西环素是MMPs的抑制剂,理论上来说能预防或减少不定期出血天数,但由于MMPs表达需取子宫内膜组织活检进行检测,且由于很难准确地在出血时间和位置取到子宫内膜组织^[9],造成相关研究缺乏,实际临床应用较少,其是否能改善不定期出血存在争议^[7,19]。Kaneshiro等^[24-25]对持续口服COC女性的RCT发现,连续口服抗菌剂量的多西环素(100 $\text{mg}\times 2$ 次/d)对于预防及减少不定期出血的天数并无明显作用,但连续口服低剂量多西环素(20 $\text{mg}\times 2$ 次/d)组的不定期出血发生率较安慰剂组低。

5.5 更改孕激素种类及含量

总的来说,更改孕激素种类或含量是否会改善不定期出血,目前仍存在争议,但总体倾向于更改孕激素种类或含量不会改善不定期出血^[7,14]。一项多中心RCT比较使用含屈螺酮或左炔诺孕酮的避孕药期间不定期出血的发生率,结论为含屈螺酮的避孕药不定期出血的发生率更低^[26]。一项系统综述的初步统计结果为第三代孕激素使用期间不定期出血的发生率较第二代孕激素低($RR=0.79$, 95% CI: 0.60~0.98),但当只纳入符合随机双盲对照研究时,第三代孕激素和第二代孕激素之间无明显差异($RR=0.79$, 95% CI: 0.50~1.26),故仍需进一步研究证实^[27]。另外有研究表明,更改孕激素剂量不会改善不定期出血。一个小样本RCT将左炔诺孕酮含量为90 μg 与100 μg 的避孕药进行长期性使用比较,结果发现两组患者在不定期出血的天数方面无明显差异^[25],可能与该研究中设定的剂量差别不大有关。

5.6 选择三相型口服避孕药

对比单相、双相及三相COC不定期出血发生率差异的文章较少,证据相对缺乏^[14]。两项系统性综述^[28-29]结果表明,单相与双相、双相与三相COC的不定期出血发生率并无明显差异。

5.7 更改用药方案

目前,几乎所有的研究结果均提示,延长性应用COC相比于传统周期性用药方案,在固定期限内的总出血天数减少,但不定期出血天数未明显减少^[14]。一项多中心RCT表明,延长用药方案与传统周期性用药相比,不定期出血发生率并未减少^[30]。另一项多中心RCT结果显示,延长用药方案与传统周期性用药相比,不定期出血持续时间不仅未减少,反而增多^[31]。因此在延长用药方案中出现了不定期出血时,首先建议短暂停用。

5.8 对于较长时间不定期出血的其他处理

在规律口服COC3~4个月后,不定期出血若仍持续存在则需要排除病理性原因。在排除病理性原因后,如果不定期出血仍持续存在,建议更换COC种类^[18]。不建议较长时间出血的妇女口服抗生素,因为有回顾性研究指出口服避孕药期间同时服用抗生素,可能会减弱避孕效果,增加避孕失败率,限制了抗生素等其他药物在不定期出血治疗过程中的使用^[12]。除此之外,对于吸烟同时服用其他药物的妇女,戒烟及避免不必要药物的同时服用,可在一定程度上降低长期口服COC妇女不定期出血的发生率^[13]。

6 小结

综上所述, 不定期出血是妇女服用 COC 期间的常见问题。国内外关于不定期出血的定义、分类尚缺乏统一标准。不定期出血的治疗方法有限且存在不同程度的争议。对于有意愿服用 COC 的妇女, 作为临床医生, 要充分告知正确的应用方法及用药过程中可能发生的不定期出血, 改善其满意度和依从性, 从而可减少意外妊娠的风险。对于已经出现不定期出血的妇女, 应根据个体化原则进行临床评估后作出正确处理, 避免过度干预。

参 考 文 献

- [1] 复方口服避孕药临床应用中国专家共识专家组. 复方口服避孕药临床应用中国专家共识 [J]. 中华妇产科杂志, 2015, 50: 81-91.
- [2] Maguire K, Westhoff C. The state of hormonal contraception today: established and emerging noncontraceptive health benefits [J]. *Am J Obstet Gynecol*, 2011, 205: S4-S8.
- [3] 中华医学会妇产科学分会绝经学组. 围绝经期异常子宫出血诊断和治疗专家共识 [J]. 协和医学杂志, 2018, 9: 313-319.
- [4] Shlomo M, Kenneth S, Polonsky P, et al. *Williams Textbook of Endocrinology* [M]. 13th ed. Amsterdam: Elsevier, 2015: 664-693.
- [5] Reid RL, Fortier MP, Smith L, et al. Safety and bleeding profile of continuous levonorgestrel 90 mcg/ethinyl estradiol 20 mcg based on 2 years of clinical trial data in Canada [J]. *Contraception*, 2010, 82: 497-502.
- [6] Mishell DR Jr, Guillebaud J, Westhoff C, et al. Recommendations for standardization of data collection and analysis of bleeding in combined hormone contraceptive trials [J]. *Contraception*, 2007, 75: 11-15.
- [7] Lumsden MA, Gebbie A, Holland C. Managing unscheduled bleeding in non-pregnant premenopausal women [J]. *BMJ* (Online), 2013, 346: f3251
- [8] Galant C, Berliere M, Dubois D, et al. Focal expression and final activity of matrix metalloproteinases may explain irregular dysfunctional endometrial bleeding [J]. *Am J Pathol*, 2004, 165: 83-94.
- [9] Vincent AJ, Zhang J, Ostor A, et al. Matrix metalloproteinase-1 and-3 and mast cells are present in the endometrium of women using progestin-only contraceptives [J]. *Hum Reprod*, 2000, 15: 123-130.
- [10] Hickey M, Fraser IS. Clinical implications of disturbances of uterine vascular morphology and function [J]. *Baillieres Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*, 2000, 14: 937-951.
- [11] Endrikat J, Gerlinger C, Plettig K, et al. A meta-analysis on the correlation between ovarian activity and the incidence of intermenstrual bleeding during low-dose oral contraceptive use [J]. *Gynecol Endocrinol*, 2003, 17: 107-114.
- [12] Dickinson BD, Altman RD, Nielsen NH, et al. Drug interactions between oral contraceptives and antibiotics [J]. *Obstet Gynecol*, 2001, 98: 853-860.
- [13] Rosenberg MJ, Waugh MS, Stevens CM. Smoking and cycle control among oral contraceptive users [J]. *Am J Obstet Gynecol*, 1996, 174: 628-632.
- [14] FSRH. Management of Unscheduled Bleeding in Women Using Hormonal Contraception [M/OL]. UK: Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare Clinical Effectiveness Unit, 2009: 1-19. <https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/unscheduledbleeding23092009.pdf>.
- [15] CDC. Sexually Transmitted Disease Surveillance 2016 [M/OL]. US: Centers for Disease Control and Prevention, 2016. https://www.cdc.gov/std/stats16/CDC_2016_STDS_Report-for508WebSep21_2017_1644.pdf.
- [16] Chen XS, Peeling RW, Yin YP, et al. The epidemic of sexually transmitted infections in China: implications for control and future perspectives [J]. *BMC Med*, 2011, 9: 111.
- [17] Speroff L, Darney PD. *A Clinical Guide For Contraception* [M]. 5th ed. US: Lippincott Williams&Wilkins, 2010.
- [18] Hickey M, Agarwal S. Unscheduled bleeding in combined oral contraceptive users: focus on extended-cycle and continuous-use regimens [J]. *J Fam Plann Reprod Health Care*, 2009, 35: 245-248.
- [19] Division of Reproductive Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) US. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2013: adapted from the World Health Organization selected practice recommendations for contraceptive use, 2nd edition [J]. *MMWR Recomm Rep*, 2013, 62: 1-60.
- [20] Kaunitz A, Howard B, Weiss H, et al. Bleeding profile of a novel ascending-dose, extended-regimen ethinyl estradiol/levonorgestrel combination oral contraceptive (OC) [J]. *Contraception*, 2013, 88: 311-312.
- [21] Gallo MF, Nanda K, Grimes DA, et al. 20 µg versus >20 µg estrogen combined oral contraceptives for contraception [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2013, (8): CD003989.
- [22] Edelman AB, Koontz SL, Nichols MD, et al. Continuous oral contraceptives: are bleeding patterns dependent on the hormones given? [J]. *Obstet Gynecol*, 2006, 107: 657-665.

- [23] Sulak PJ, Kuehl TJ, Coffee A, et al. Prospective analysis of occurrence and management of breakthrough bleeding during an extended oral contraceptive regimen [J]. *Am J Obstet Gynecol*, 2006, 195: 935-941.
- [24] Kaneshiro B, Edelman A, Carlson N, et al. Treatment of unscheduled bleeding in continuous oral contraceptive users with doxycycline: a randomized controlled trial [J]. *Obstet Gynecol*, 2010, 115: 1141-1149.
- [25] Kaneshiro B, Edelman A, Carlson NE, et al. Unscheduled bleeding with continuous oral contraceptive pills: a comparison of progestin dose [J]. *Contraception*, 2012, 86: 22-27.
- [26] Apter D, Zimmerman Y, Beekman L, et al. Bleeding pattern and cycle control with estetrol-containing combined oral contraceptives: Results from a phase II, randomised, dose-finding study (FIESTA) [J]. *Contraception*, 2016, 94: 366-373.
- [27] Lawrie TA, Helmerhorst FM, Maitra NK, et al. Types of progestogens in combined oral contraception: effectiveness and side-effects [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2011, (5): CD004861.
- [28] Van Vliet HA, Grimes DA, Helmerhorst FM, et al. Biphasic versus monophasic oral contraceptives for contraception: a Cochrane review [J]. *Hum Reprod*, 2002, 17: 870-873.
- [29] Van Vliet HA, Grimes DA, Helmerhorst FM, et al. Biphasic versus triphasic oral contraceptives for contraception [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2006, (3): CD003283.
- [30] Anderson FD, Hait H. A multicenter, randomized study of an extended cycle oral contraceptive [J]. *Contraception*, 2003, 68: 89-96.
- [31] Wiegratz I, Stahlberg S, Manthey T, et al. Effect of extended-cycle regimen with an oral contraceptive containing 30 mcg ethinylestradiol and 2 mg dienogest on bleeding patterns, safety, acceptance and contraceptive efficacy [J]. *Contraception*, 2011, 84: 133-143.

(收稿日期: 2017-08-25)

· 读者 · 作者 · 编者 ·

本刊对来稿中计量单位及数字的有关要求

本刊执行 GB3100~3102-1993 《量和单位》中有关量、单位和符号的规定及其书写规则。注意单位名称与单位符号不可混用。组合单位符号中表示相除的斜线多于 1 条时应采用负数幂的形式表示, 组合单位中斜线和负数幂亦不可混用, 如应采用 $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 或 $\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$, 而不宜采用 $\text{mg}/\text{kg}/\text{d}$ 或 $\text{mg}/\text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 的形式。在叙述中应先列出法定计量单位数值, 括号内写旧制单位数值。凡涉及人体及动物体内的压力测定, 可以使用 mmHg 或 mmH_2O , 但首次使用时应注明与 kPa 的换算关系。

本刊执行 GB/T15835-1995 《出版物上数字用法的规定》中有关数字的规定及其书写规则。定型的词、词组、成语、惯用语、缩略语或具有修辞色彩的词语中作为语素的数字, 必须使用汉字, 如二倍体、第三季度。凡是可以使用阿拉伯数字而且又很得体的地方, 特别是当所表示的数目比较精确时, 均应使用阿拉伯数字。统计表中的数值, 如正负整数、小数、百分比、分数、比例等, 必须使用阿拉伯数字。公历世纪、年代、年、月、日、时、分、秒要求使用阿拉伯数字, 年份不能简写。物理量量值必须用阿拉伯数字, 并正确使用法定计量单位。非物理量一般情况下应使用阿拉伯数字, 如 45.6 万元。